

PAUTAS DE ATENCIÓN PREVENTIVA INFANTIL

Guía sobre el calendario de vacunación para su hijo

En Cigna Medical Group, nuestros pediatras siempre le brindan las recomendaciones más actualizadas para sus hijos. Seguimos las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y los departamentos de salud del condado o del estado. El cronograma de atención preventiva infantil (del niño sano) refleja las recomendaciones más recientes. Entre los cinco y los 14 años de edad, se recomienda que los niños que no tengan ninguna enfermedad crónica se realicen controles todos los años.

EDAD	PRUEBAS/INMUNIZACIONES
3-4 días o 2 semanas	Examen médico del recién nacido de Arizona
2 meses	DTaP, IPV, hepatitis B, Hib, Prevnar13®, RotaTeq®
4 meses	DTaP, IPV, Hib, Prevnar13, RotaTeq
6 meses*	DTaP, IPV, hepatitis B, Hib, Prevnar13, RotaTeq
9 meses	Hemoglobina
1 año	Prevnar13, hepatitis A, MMR, varicela
15 meses	DTaP, Hib
18 meses	Hepatitis A
2 años	Las vacunas que no se haya dado anteriormente, examen de evaluación del desarrollo, asesoramiento sobre comportamiento
3 años	
4-5 años	DTaP, IPV, M-M-R II, varicela 2, examen de la vista/la audición
11-12 años	Tdap, Menactra®, HPV
14-18 años	Tdap, Menactra, HPV (todas de ser necesario)

Referencia:

- IPV = vacuna antipoliomielítica inactivada
- Tdap = vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular
- Menactra = vacuna contra la meningitis meningocócica
- RotaTeq = Rotavirus
- DTaP = vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular
- MMR = Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
- HPV = vacuna contra el virus del papiloma humano
- Hib = Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
- Prevnar13 = vacuna contra infecciones neumocócicas

Siempre que estén disponibles y corresponda su aplicación, se usarán vacunas combinadas para reducir la cantidad de inyecciones que recibirá su hijo.

Las únicas vacunas monovalentes disponibles son las que se indican arriba.

La vacuna antigripal se administra desde los seis meses de edad hasta los 18 años, y a partir de los seis meses para afecciones de alto riesgo (en temporada).

**DEBE tener al menos seis meses de edad para la vacuna contra la hepatitis B 3.*

